Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation

Gérant 1 M. S. DUYAUCHELLE -

Station Nord Pas-de-Calais - Directeur

å

agricoles



CULTURES

vertissem



BULLETIN TECHNIQUE Nº 18 DU 12 JUIN 1989

BLES D'HIVER : Pucerons épi rares

Rouille brune calme

POIS: Maladies rares

BETTERAVES: Pucerons noirs

COLZA: Alternaria

Journées Dijon

BLES D'HIVER

STADE : Floraison souvent dépassée.

Pucerons: rares sur les épis

Maladies:

La rouille brune progresse (Apollo, Fidel, Camp-Remy, Thésée) mais sans aucune gravité pour le moment.

La Septoriose et <u>L'Oîdium</u> progressent suite aux pluies de début juin mais atteignent rarement la F2.

La Rouille jaune : repiquages sur F1 dans toutes les parcelles où elle a pu se développer précédemment.

PRECONISATIONS:

Pas d'intervention insecticide sur épis.

Pas de traitement de post épiaison avec fongicides de contact vu la faible pression de septoriose.

Mais interventions vis-à-vis Rouille jaune justifiées localement dans certaines parcelles.

REMARQUE:

La Jaunisse nanisante est évidemment le problème n°1 de la campagne sur les céréales. Au moins 1 parcelle sur 2 est concernée en blés d'hiver avec nombreux symptômes de feuilles terminales rouges, jaunes ou décolorées suivant les variétés.

Les escourgeons contaminés ont une maturité très précoce et ont souffert beaucoup plus que les blés de la sècheresse de mai. Le verdict de la moissonneuse est attendu avec inquiètude. \mathcal{P}



MINISTERE DE L'AGRICULTURE - D.R.A.F.
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Cité Administrative - 59048 LILLE CEDEX - Tél. 20.52.00.25

STATION REGIONALE: - Avertissements Agricoles - Laboratoire.
rue Bernard Palissy B.P. 47 - 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. 21.28.27.27

Abonnement annuel:

annuel: à l'ordre 180,00 F Régisseur de Recettes D.R.A.F. Nord Pas-de-Calais

ISSN 0758-7988 - CPPAP nº 1865 AD

POIS

Pleine floraison partout.

Maladies : malgré les pluies de début juin, pas de démarrage marqué de Botrytis et Anthracnose.

Pucerons: peu nombreux dans l'ensemble, mais en progression localement.

A ce stade de végétation, le seuil de traitement est de 30 pucerons par pied : seuil loin d'être atteint dans la plupart des parcelles.

PRECONISATIONS:

Conformément à nos avis le ler fongicide a été retardé. Son renouvellement n'est pas justifié par la situation sanitaire actuelle.

BETTERAVES

<u>Pucerons</u>: Les différentes espèces vectrices volent toujours mais l'élément le plus marquant est la poursuite de l'installation et du développement des colonies de pucerons noirs (Aphis fabae).

Dans ces conditions, la protection doit être poursuivie :

- semis fin avril: traitements foliaires à environ 14 jours d'intervalle.
- semis fin mars : la protection peut s'allèger, intervention à l'installation de nouvelles colonies de pucerons noirs.

COLZA

ALTERNARIA

SITUATION:

Cette maladie est présente dans la majorité des parcelles au moins sur les feuilles du bas. Elle est en progression et on peut en trouver çà et là sur hampe et silique. Le temps actuel : chaleur + humidité, lui est favorable.

PRECONISATION:

L'Alternaria peut occasionner des dégâts jusque 3 semaines avant récolte. Sont principalement à surveiller les parcelles traitées depuis plus de 3 semaines.



DIJON 14 & 15 JUIN

COLZA 89 : LES 14 ET 15 JUIN 1989 A TIL-CHATEL (PRÈS DE DIJON)

Entrée gratuite. Ouvert de 10 heures à 19 heures. Situé à la sortie de l'autoroute Nancy-Dijon. Accès par l'autoroute, le T.G.V., l'avion...